

Гепатоцеллюлярная карцинома (ГЦК)

На данный момент в клинике «Витамед» ведется набор на **БЕСПЛАТНОЕ** лечение гепатоцеллюлярной карциномы.

Рандомизированное, открытое, международное, многоцентровое клиническое исследование фазы 3 применения антитела к белку программируемой смерти клеток 1 (PD-1) SHR-1210 в комбинации с апатиниба (ривоцераниба) мезилатом в сравнении с сорафенибом в качестве терапии первой линии у пациентов с распространенной гепатоцеллюлярной карциномой (ГЦК), ранее не получавших системную терапию

Протокол SHR-1210-III-310

Спонсор: Цзянсу Хэнжуй Медисин Ко., Лтд

Статус: Набор открыт

Основные критерии отбора:

1. Наличие ГЦК, подтвержденной результатами гистопатологических или цитологических анализов.
2. Пациент может предоставить свежий или архивный образец опухолевой ткани .
3. Стадия В или С по классификации BCLC
4. Оценка по классификации Чайлда — Пью: класс А.
5. Пациент раньше не получал системную терапию по поводу распространенной ГЦК.
6. Наличие по меньшей мере одного измеримого поражения
7. Функционирование основных органов является хорошим.

Основные критерии исключения:

1. Наличие известной гепатохолангиокарциномы, саркоматоидной ГЦК, смешанно-клеточной карциномы и чешуйчато-клеточной карциномы; наличие других активных злокачественных опухолей, помимо ГЦК, в течение последних 5 лет или в настоящее время.
2. Наличие умеренного или тяжелого асцита с клиническими симптомами
3. Наличие в анамнезе желудочно-кишечного кровотечения в течение 6 месяцев до начала лечения
4. Наличие свища брюшной полости, перфорации желудочно-кишечного тракта или внутрибрюшинного абсцесса в течение 6 месяцев до начала лечения в рамках исследования.
5. Наличие тромбоза или тромбоэмболического явления в течение 6 месяцев
6. Наличие клинического симптома или заболевания со стороны сердца.
7. Наличие серьезного сосудистого заболевания в течение 6 месяцев
8. Наличие непроходимости кишечника и (или) клинических признаков
9. Наличие метастазов в центральную нервную систему в настоящее время или в прошлом.
10. Наличие метастатического заболевания, сопровождающегося поражением основных дыхательных путей или кровеносных сосудов
11. Наличие печеночной энцефалопатии в анамнезе.
12. Наличие интерстициальной пневмонии или интерстициального заболевания
13. Наличие активного аутоиммунного заболевания либо наличие в анамнезе аутоиммунного
14. Применение сильных индукторов CYP3A4/CYP2C19